

FAKTY DOTYCZĄCE MRSA CC 398 – CZYLI GRONKOWCA ZŁOCISTEGO OPORNEGO NA METACYLINĘ

Wrzesień 2014

Minister Zdrowia Nick Hækkerup, zakazał organizowania wycieczek szkolnych do chlewni zakażonych gronkowcem złocistym opornym na metycylinę. Zakaz ten spowodowany jest mającym miejsce w latach 2013 i 2014 zatrważającym wzrostem liczby osób zarażonych gronkowcem złocistym opornym na metycylinę. Bakteria ta jest znacznie bardziej zaraźliwa, niż sądzono dotychczas. Istnieje ryzyko, że uczniowie zwiedzający hodowlę świń, mogliby przywlec te bakterie z farmy do domów opieki, co byłoby śmiertelnie niebezpieczne dla ludzi starszych.

Duński Instytut Chorób Zakaźnych (SSI) potwierdza, że MRSA może być roznoszony drogą płciową. Według Duńskiego Ministerstwa Rolnictwa i Weterynarii osoba zatrudniona przy hodowli trzody chlewnej najprawdopodobniej jest nosicielem MRSA CC 398. Może zarazić partnera, odbywając z nim stosunek płciowy. Może zarazić dzieci, dotykając ich. MRSA-398 może się szerzyć drogą kropelkową, to jest przez kichanie, kaszel i wydmuchiwanie nosa.

Bakterie mogą przez wiele miesięcy przetrwać w meblach, dywanach oraz na klamkach drzwi. Nawet jeśli się zmienia ubranie i bierze prysznic po powrocie z chlewni do domu, istnieje ryzyko zarażenia rodziny.

MRSA CC398 został wykryty w pochwach kobiet. Istnieje wielkie ryzyko, że podczas naturalnego porodu może zostać zakażone dziecko. Dziecko może się również zakażić poprzez kontakt ze skórą matki podczas karmienia piersią, zmiany pieluszek oraz gdy matka nosi je i całuje.

MRSA rozprzestrzenia się poprzez dotyk, tj. podczas stosunku płciowego, uścisku dłoni, przytulania i pocałunków. Dlatego rodzina, przyjaciele i zwierzęta domowe osób zatrudnionych w chlewniach są narażone na ryzyko infekcji. I mogą zarażać innych.

20% osób zakażonych w latach 2013-14 nie miało żadnych kontaktów ze świniami ani z pracownikami chlewni.

MRSA CC 398 został również wykryty w odbytnicy. Jeśli ktoś jest nosicielem, może nagle bardzo poważnie zachorować. Nie zdarza się to często, ale dotyka nawet zdrowych i silnych ludzi.


Co należy robić, by nie zarazić innych?

Leczenie infekcji będzie daremne tak długo, jak dana osoba będzie pracować przy świniach. Dlatego pracownikom chlewni nie wolno uprawiać seksu i wchodzić w bliski kontakt z osobami niezarażonymi. Powinni oni udać się do lekarza, który pobierze wymaz. A potem widywać się wyłącznie z ludźmi, którzy także są zarażeni.

Jednakże istnieje ryzyko, że i tak zostanie się zarażonym przez inny, bardziej agresywny MRSA.

Leczenie jest wciąż możliwe, jednak może prowadzić do potrzeby hospitalizacji oraz być źródłem nieprzyjemnych skutków ubocznych. W przyszłości problem będzie wzrastał ponieważ antybiotyki są stosowane w hodowli świń. Dla własnego bezpieczeństwa pozbań się MRSA i znajdź sobie inną pracę, gdzie nie zagraża zarażenie odpornymi na leki bakteriami.

Antal tilfælde af MRSA, År: 2007-2014, Type: CC398



Informacja ta pochodzi ze strony Duńskiego Ministerstwa Rolnictwa i Weterynarii, i zgodna jest z danymi Duńskiego Instytutu Chorób Zakaźnych oraz Uniwersytetu Południowej Jutlandii. Opublikowane przez blog www.sickpigs.dk, Knud Haugmark

**UWAŻAJ. NIE ROZPRZESTRZENIAJ MRSA.
POZBAŃ SIĘ GRONKOWCA ZŁOCISTEGO OPORNEGO NA
METACYLINĘ I ZNAJDŹ SOBIE BEZPIECZNIEJSZE ZAJĘCIE.
MRSA MUSI SIĘ NATYCHMIAST PRZESTAĆ
ROZPRZESTRZANIAĆ!**